

## Ratón Espiguero de las Marismas (*Reithrodontomys raviventris*)

Status -- Federal: En Peligro ; California: En Peligro

Foto: B. "Moose" Peterson/WRP



El ratón espiguero de las marismas (Salt Marsh Harvest Mouse) es un roedor pequeño, mayormente nocturno, de las marismas costeras de la Bahía de San Francisco y sus afluentes. Mide de 2.75 a 3.0 pulgadas (6.9 a 7.5 cm).

Su cola puede ser tanto o más larga que el cuerpo.

Su peso va de 0.3 a 0.5 onzas (9 a 14 grs)

Su pelaje es café oscuro en el lomo, mientras que el vientre y los costados son color canela-rosado.


Este roedor prefiere las marismas costeras densamente vegetadas con Espárrago de Mar (*Salicornia sp.*). Los prados y pastizales adyacentes a las marismas también son utilizados, pero solamente cuando nuevos brotes de pasto proveen cobertura suficiente. En primavera y verano, algunos ratones realizan incursiones diarias desde el Espárrago de Mar a los pastizales. Esto sólo sucede si hay suficiente vegetación que los proteja de sus depredadores.



Marismas con *Salicornia sp.*

Foto: Tupper Ansel Blake

## Ratón Espiguero de las Marismas



### Comparaciones de Cráneos: Ratón Espiguero v.s. Ratón Doméstico



El Ratón Espiguero tiene un borde lateral en el diente incisivo superior



El Ratón Doméstico tiene una muesca en el diente incisivo superior

**Comportamiento** - Este ratón es principalmente nocturno, sin embargo, también se le ha observado actividad crepuscular en condiciones de laboratorio. Esta especie permanece activa todo el año. Los ratones espigueros son buenos nadadores y escaladores. No utilizan madrigueras, sino que ellos hacen un nido de pasto, o bien utilizan nidos abandonados de aves.

**Distribución** - Se sabe de dos subespecies divididas en dos rangos: Norteña, distribuida en los condados de Marin, Sonoma, Napa, Solano y el norte de Contra Costa; Sureña, distribuida en los condados de San Mateo, Alameda y Santa Clara. Además, algunas poblaciones aisladas habitan en Marin y Contra Costa.

**Reproducción** - Su reproducción se lleva a cabo de la primavera al otoño. Producen dos camadas por año. La camada promedio es de 3 a 4 juveniles. No se tiene información sobre la edad de destetado ni la de madurez sexual.

**Alimentación y Agua** - Se cree que los Ratones Espigueros se alimentan de semillas, hierbas y pasto disponibles en su hábitat. Durante el invierno prefieren los pastos frescos. El resto del año se alimentan de Espárrago de Mar y Pasto Salado. Necesitan agua fresca, aunque se sabe que también consumen agua salobre y hasta agua salada.



California Department of Pesticide Regulation  
Endangered Species Project  
[www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/index.htm](http://www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/index.htm)

