

## Halcón de Swainson: Identificación



Fotos: Leopoldo A. Moreno, CDPR

En el Valle Central, los halcones de Swainson construyen nidos grandes, cerca de la copa de árboles como los Álamos, Encinas o Sauces. Se les puede hallar anidando tanto en densas arboledas con vegetación riparia, así como en árboles solitarios a lo largo de ríos, arroyos y ciénagas. También anidan en árboles junto a campos agrícolas de alfalfa, pastura, remolacha, tomate, y otros cultivos de campo abierto, así como campos sin cultivar. Los nidos de esta especie son grandes y como plataformas, y están contruidos principalmente a base de palos. Algunos nidos los construyen justo por encima de plantas de muérdago.

## Halcón de Swainson



Halcón de Swainson



Halcón de Cola Roja

Los nidos duran por varios años, y pueden ser utilizados no sólo por varios pares de halcones de Swainson, sino también por distintas aves rapaces como el halcón cola roja, halcon pecho rojo, y el tecolote cornudo. Cuando los halcones de Swainson llegan de su migración de invierno, a veces encuentran su nido ya ocupado por otras aves rapaces. Esta competencia por los nidos es otro indicador de la limitada cantidad de hábitat de anidación adecuado que hay actualmente.

**Identificación de Halcones en Vuelo:** Al novato le puede ser difícil distinguir halcones de Swainson con respecto a otras especies semejantes como el halcón cola roja. Sin embargo, hay ciertos patrones de forma y coloración que los distinguen, especialmente cuando están volando (ver dibujo). Los halcones de Swainson tienen las alas más esbeltas y puntiagudas que los halcones cola roja, los cuales tienen alas anchas y redondeadas. Los halcones cola roja adultos – como su nombre lo dice- tienen la cola de color café rojizo. Si bien ambas especies tienen variaciones de plumaje (morfos) pálidos y oscuros, los esquemas o patrones que se observan en el lado ventral (por debajo) son casi negativos uno del otro. Los halcones de Swainson tienden a tener un “babero” oscuro en el pecho, mientras que los cola roja tienen el pecho claro rodeado de plumas oscuras. El borde de ataque de las alas del halcón cola roja es oscuro, mientras que en el de Swainson es claro. Las plumas de vuelo del halcón de Swainson tienden a ser más oscuras que las del cola roja; en contraste, las plumas cobertoras en su lado ventral (por debajo) son más claras en el halcón de Swainson. Los individuos de morfos oscuros en ambas especies pueden ser difíciles de distinguir a primera vista.



California Department of Pesticide Regulation  
Endangered Species Project  
[www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/index.htm](http://www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/index.htm)

