


Halcón de Swainson (*Buteo swainsonii*)

Status -- Federal: Ninguno; California: Amenazado



Morfo Oscuro



Morfo Oscuro en Vuelo



Morfo Intermedio en vuelo



Morfo Intermedio

Los halcones de Swainson (SH) son aves rapaces de tamaño mediano, un poco más chicos que los halcones de cola roja. Son aves migratorias de gran distancia, y vuelan desde Norteamérica hasta Argentina, que es donde invernan. A principios de la primavera, regresan a sus áreas de reproducción en Norteamérica. Al igual que otros halcones, presentan varias coloraciones de plumaje ó “morfos”, que van desde el pálido hasta el oscuro.



California Department of Pesticide Regulation
Endangered Species Project
www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/index.htm



Halcón de Swainson



Características: Los halcones de Swainson pesan aproximadamente 2 libras (1 kilo), y tienen una envergadura de 48 pulgadas (120 cm.). Ambos sexos son de apariencia similar, sin embargo, la hembra es ligeramente más grande que el macho. Los adultos por lo general tienen las plumas dorsales de color oscuro, mientras que el plumaje del cuerpo por debajo presenta varios morfos dependiendo de la proporción de plumas blancas o cafés.

Comportamiento: Estos halcones son muy territoriales, particularmente durante la construcción del nido e incubación. Los que anidan en áreas relativamente aisladas con poco ruido son muy susceptibles a las perturbaciones, en particular la actividad humana y el ruido. Es sabido que algunos halcones de Swainson anidan en zonas urbanas, con altos niveles de actividad humana y ruido; sin embargo esto es más la excepción que la norma, y probablemente un índice de cuánto hemos invadido los humanos el habitat de esta especie.

Alimento: Durante la época reproductora se alimentan de roedores como las ardillas terrestres, ratones de campo, etc., y en un menor porcentaje de chapulines, langostas y otros insectos. Cuando invernan en Argentina, se alimentan principalmente de chapulines y langostas, para lo cual seguido vuelan hacia los frentes de tormentas, ya que éstos acarrear grandes cantidades de dichos invertebrados.

Distribución: En California, el rango de los halcones de Swainson abarca el Valle Central, con las mayores concentraciones de nidos en los condados de Yolo, Sacramento y San Joaquín. En el condado de Siskiyou, el Valle de Butte mantiene una de las más altas densidades de nidos de halcón de Swainson. Estudios recientes en dicho valle parecen confirmar que mientras más cercano esté el hábitat alimenticio de buena calidad a los nidos de estos halcones, ellos tienen una mayor productividad de juveniles.